

- [Oltások](#)
- [Féregtelenítések](#)
- [Csípőizületi diszplázia \(HD\)](#)

### Oltások

A vásárolt kölyöknek az alapvető immunizációt már a tenyésztőnél meg kellett kapnia. A kutyákat parvovirus, hepatitis és leptospirosis ellen oltják. Ezek az első oltások benne vannak az oltási könyvben, amelyet Ön a tenyésztőtől kapott. Az oltásokat kéthetente kell ismételni. Az oltások időpontjait és számát minden esetben állatorvosa szabja meg. A kutyát kb. 5 hónapos korában veszettség ellen is beoltják.

A kutyának minden évben ismétlőoltásokat kell kapnia. Ne felejtse el ezeket az ismétlő oltásokat sem, mert csak egy helyesen oltott kutya ellenálló a folyamatos fertőzésekkel szemben, és képes ellenállni a veszélyes és sokszor halálos betegségeknek.

1. oltás /6-hét/

Parvo ellen

Nobivac Parvo C

+2 hét

Kombinált

Nobivac DHPPi +Lepto

## Kutya egészségügy

Írta: Administrator

2009. július 01. szerda, 19:33 - Módosítás: 2009. július 01. szerda, 19:49

---

+2 hét

Kombinált

Nobivac DHPPi +Lepto

+2 hét

Tetra-dog

Nobivac DHPPi + RL

+2 hét

Corona

Corona

+ 6 hó

Hexa-dog

Nobivac DHPPi + RL

## Féregtelenítések

A tenyésztő az Ön által elhozott kiskutyát már féregtelenítette néhányszor. Figyelje meg kutyája széketét, és végezzen ősszel és tavasszal rendszeresen féregtelenítő kúrát. A kúra menetéről és a használatos gyógyszerről állatorvosa tájékoztatja.

Ha a kutya sokat eszik, és mégis fogy, vagy nem hízik megfelelő mértékben, könnyen lehet, hogy férgesség az oka.

**A kiskutyákat kölyökkorban féregteleníteni kell legalább háromszor, erre több speciális készítmény áll rendelkezésre, az oltási könyvbe be kell hogy jegyezze legyen az utolsó oldalon.**

2-3 hét	Kuma-Gél	
5-6 hét	Kuma-Gél	
7-8 hét	Drontál plus, vagy Cestal	plus
9-10 hét	Drontál plus, vagy Cestal	plus

+ 6 havonat

Drontál plus, vagy Cestal plus

## Csípőizületi diszplázia (HD)

A csípőizületi diszplázia a csípőizület örökölhető, beteges elváltozása, ami minden kutyafajtánál, a kisebb testűeknél is előfordulhat, előfordulása mindazonáltal a nagytestű fajtáknál gyakoribb.

Akkor beszélhetünk csípőizületi diszpláziáról, ha az egyik vagy mindkét csípőizületben az izületi vápa nem korrekt kiképzésű, vagy súlyosabb esetekben egyáltalán nem képes arra, hogy a

combcsonthoz köthet. A combcsontfej laposodásai is hozzájárulhatnak, hogy az ízület nem tökéletesen működőképes. Ezen elváltozások nyomán általában a combcsontfej odanyomódik az ízületi vápához, ami jelentős fájdalommal, gyakorlatilag állandó ízületi gyulladással és így mozgáskorlátozottsággal jár.

A csípőizületi diszplázia egy olyan betegség, ami tudatos tenyésztői munkával leküzdhető és kiküszöbölhető. A hovárt fajta iránt érzett felelősségből minden tenyésztőnek és a nem tenyésztő kutyatartóknak is meg kell röntgeneztetniük kutyájukat, kb.2-3 éves korban szűrés céljából.

A szűrésre 15 hónapos kortól, végleges eredmény kimondására azonban csak 2 éves kortól kerülhet sor. Így, ha csak probléma nincs a kutya ízületével, célszerű a szűrővizsgálatot 2 éves kor után elvégeztetni.

A szűréshez szükséges röntgenfelvételt állatorvosok végezhetik. A felvétel elkészítése után azt a kutya eredeti származási lapjával együtt el kell küldeni az Egyesületünk által kijelölt állatorvosnak, aki kiértékeli a röntgenfelvételt, és minősíti a kutya csípőizületét. A minősítés lehet: mentes, majdnem mentes, enyhe, közepes és súlyos. Hazánkban a mentes és majdnem mentes eredményekkel lehet tenyésztésbe venni hovárt kutyát. Bővebb információ a [diszpláziaszűrésről itt](#).

Enyhe, közepes és súlyos esetekben mindenkor konzultáljunk a tenyésztővel és állatorvosunkkal annak érdekében, hogy a kutya állapotának megfelelően módosítsuk annak táplálkozását, mozgását és életvitelét, hogy az esetleges betegségnek megfelelő legjobb életet élhesse a kutya. A csípőizületi diszplázia helyes életvitellel és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel kezelhető, de sajnos ma még hatásosan nem gyógyítható.

A röntgenvizsgálatot altatásban végzik, így figyeljen oda, hogy kutyája a vizsgálat előtt 24 órával ne egyen, és az állatorvossal közölje hozzávetőleges súlyát, ami az altatószer adagolása miatt szükséges. A kutya ébredésével és az ezzel kapcsolatos teendőkre vonatkozólag kérje ki állatorvosa tanácsát.

A röntgenvizsgálat eredménye felkerül a kutya származási lapjára, és bevezetésre kerül a törzskönyvbe.

## Kutya egészségügy

Írta: Administrator

2009. július 01. szerda, 19:33 - Módosítás: 2009. július 01. szerda, 19:49

---